



**Cysticare**

**Utipro<sup>®</sup>**  
PLUS

**Toepassing:**

ROTER Cysticare – Utipro Plus is een medisch hulpmiddel voor het bedwingen en voorkomen van urineweginfecties, veroorzaakt door ziekteverwekkers als E. Coli en andere gramnegatieve bacteriën, die vaak betrokken zijn bij urineweginfecties.

ROTER Cysticare – Utipro Plus moet oraal ingenomen worden, zodra de eerste symptomen van een urinewegstoomnis optreden: dan helpt het de vermenigvuldiging van ziekteverwekkers tegen te gaan en het risico op infecties te verminderen. Bij herinfectering kan ROTER Cysticare - Utipro Plus nieuwe episodes voorkomen, door de vermenigvuldiging van de ziekteverwekkers, die verantwoordelijk zijn voor urineweginfecties, te beperken.

De samenstelling, gebaseerd op Gelatine en Xyloglucaan (Hemicellulose), heeft een mechanisch effect op de holtes in de darm (darmlumen). Hierdoor wordt het contact van ziektekiemen met de darmwand vermeden en wordt de eerste stap in verspreiding van ziektekiemen en verdere doorgang naar de urinewegen voorkomen.

**Verpakking:**

Het medisch hulpmiddel ROTER Cysticare – Utipro Plus is verkrijgbaar in de vorm van capsules in blisterverpakking.

**Samenstelling:**

Combinatie van Gelatine en Xyloglucaan (Hemicellulose), Propolis, *Hibiscus sabdariffa*, Siliciumdioxide, Magnesiumstearaat, Maïszetmeel.

**Dosering:**

Orale toediening.

Zodra de eerste symptomen van urinair ongemak optreden, moet ROTER Cysticare – Utipro Plus 5 dagen lang worden ingenomen in een dosering van 2 capsules per dag.

Voor het voorkomen van een herhaling moet ROTER Cysticare – Utipro Plus tenminste 15 opeenvolgende dagen worden ingenomen in een dosering van 1 capsule per dag. Zo nodig kan ROTER Cysticare – Utipro Plus herhaalde periodes gebruikt worden.

**Gebruiksaanwijzing:**

Slik de capsule door met water.

**Waarschuwingen:**

- De diagnose van een urineweginfectie moet door een arts worden vastgesteld bij twijfel over de diagnose. Het is raadzaam om een arts te raadplegen in het geval van ernstige symptomen zoals koorts; kinderen jonger dan 14 jaar; zwangere vrouwen of chronische aandoeningen.
- Een acute urineweginfectie kan een behandeling nodig hebben met een, door een arts voorgeschreven, antibioticum. Dit medisch hulpmiddel is geen antibioticum en dus geen vervanger voor een dergelijke behandeling. ROTER Cysticare - Utipro Plus kan wel tegelijkertijd met een antibiotica behandeling worden ingenomen.
- Hoewel er, bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing, geen bijwerkingen bekend zijn, mag het product niet gebruikt worden door zwangere vrouwen of tijdens de eerste maanden van de borstvoeding. Raadpleeg in elk geval eerst een arts.
- Gebruik dit product niet na de vervaldatum die op de verpakking staat.
- Neem de capsules niet in als de blister geopend of beschadigd is.
- Bewaren bij kamertemperatuur op een droge plaats, uit de buurt van een verwarming.
- Het product mag niet ingevroren worden.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

**Contra-indicaties en bijwerkingen:**

- ROTER Cysticare – Utipro Plus mag niet gebruikt worden bij personen met een bekende overgevoeligheid voor gelatine of de andere bestanddelen van dit product.

**Fabrikant:**

NOVINTETHICAL PHARMA SA  
Via Pian Scairolò 11  
6915 Lugano – Switzerland

**Distributeur:**

Imgroma BV  
Verrijn Stuartweg 60  
1112 AX Diemen, the Netherlands

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst goedgekeurd in maart 2014.

Rev 2 dated 21.03.2014

  
0373