

ROTEN NOSCAPECT 1 MG/ML, STROOP
stroop

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.3 : Bijsluiter

Bladzijde : 1

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

ROTEN NOSCAPECT 1 mg/ml, stroop
noscapine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop inneemt
3. Hoe wordt Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS ROTEN NOSCAPECT 1 MG/ML, STROOP EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep

Noscapine onderdrukt de hoestprikkel. Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.

Gebruiken

- bij prikkelhoest.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ROTEN NOSCAPECT 1 MG/ML, STROOP INNEEMT

Gebruik Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor noscapine of voor één van de andere bestanddelen van Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

ROTER NOSCAPECT 1 MG/ML, STROOP
stroop

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.3 : Bijsluiter

Bladzijde : 2

Wees extra voorzichtig met Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar gebruikt worden door bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen. De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Gebruik van Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop en andere (genees)middelen.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend. Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop

Eén ml stroop bevat 0,745 g saccharose. Bij gebruik van de maximaal aanbevolen dosering (=30 ml) levert elke dosis 22,35 g saccharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Verder kan saccharose maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Dit product bevat methylparahydroxybenzoaat, dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasme.

ROTER NOSCAPECT 1 MG/ML, STROOP
stroop

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.3 : Bijsluiter

Bladzijde : 3

3. HOE WORDT ROTER NOSCAPECT 1 MG/ML, STROOP INGENOMEN

Volg bij het gebruik van Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Volwassenen

15-30 ml 3 tot 4 maal per dag (=24 uur).

Kinderen van 6-12 jaar

15 ml 2 tot 4 maal per dag.

Kinderen van 3-6 jaar

7,5 ml 2 tot 4 maal per dag.

Als u merkt dat Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De dosering dient u af te meten met de meegeleverde maatbeker. De aangegeven dosering niet overschrijden.

U mag de stroop niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u meer van Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop om zo de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem

Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog of neusslijmvlies.

Zenuwstelsel

Sufheid, duizeligheid.

ROTER NOSCAPECT 1 MG/ML, STROOP
stroop

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.3 : Bijsluiter

Bladzijde : 4

Maag- en darmstelsel
Misselijkheid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ROTER NOSCAPECT 1 MG/ML, STROOP?

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "niet te gebruiken na" of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop

- Het werkzame bestanddeel is
noscaphinehydrochloride, 1 mg per ml stroop.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
citroenzuur(E330), methylparahydroxybenzoaat(E218), saccharoïdenatrium, saccharose, frambozenessence, gezuiverd water.

Hoe ziet Roter Noscapect 1 mg/ml, stroop er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Flacon à 150 en 300 ml stroop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Vemedica Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen

Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen:

Imgroma B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
Telefoon 0900-1011015 (25 ct/min)

ROTER NOSCAPECT 1 MG/ML, STROOP
stroop

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.3 : Bijsluiter

Bladzijde : 5

Fabrikant

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem

In het register ingeschreven onder
RVG 102471

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2015.